

Abrilar alivia la tos

TRIPLE ACCIÓN TERAPÉUTICA

MUCOLÍTICO
BRONCOESPASMOLÍTICO
ANTITUSIVO



www.abrilar.cl

Único con presentaciones adecuadas para cada paciente



Abrilar a diferencia de los jarabes codeínicos

No inhibe el reflejo de la tos a nivel central

No presenta riesgos de depresión respiratoria ni cardiovascular

No presenta riesgos de vómitos, náuseas y convulsiones

ABRILAR MUCOLÍTICO - BRONCOESPASMOLÍTICO - ANTITUSIVO

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml de solución contiene 0,7 g de alfa-hederina, (agente extractivo: etanol al 30% (p/p), 0,134 g de sorbato de potasio (conservante); otros componentes: ácido cítrico anhidro, goma de xantán, aroma, solución de sorbitol al 70%. 2,5 ml de solución contienen 0,963 g del sustituto del azúcar sorbitol= 0,08 UB. Cada comprimido efervescente contiene: Extracto seco de hojas desecadas de Hedera helix L.(5 - 7,5 : 1) 65,0 mg (equivalente a no menos de 3,25 mg de hederacósido C) (agente de extracción: etanol al 30% p/p) Excipientes: Ácido cítrico anhidro, bicarbonato de sodio, Carbonato de sodio anhidro, Manitol, Simeticona, Sacarina sódica Ciclamato de sodio, Citrato de sodio, Sorbitol, triglicéridos de cadena media, Aceite de ricino polioxil hidrogenado, Aroma a naranja. Un comprimido efervescente contiene 0,04 UB.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

ABRILAR jarabe y ABRILAR comprimido efervescente es una solución expectorante de origen natural, cuya sustancia activa aislada y purificada de la Hedera helix (hoja de hiedra) es la saponina alfa-hederina, la cual es responsable de su triple acción terapéutica: mucolítico, broncoespasmolítico y antitusígeno. Esta triple acción terapéutica explica su eficacia, en el tratamiento de las afecciones broncopulmonares que cursan con tos y aumento de las secreciones mucosas o con tos seca irritativa y obstrucción de la vía aérea al mejorar objetivamente parámetros de la función respiratoria como CV, VEF1, disnea, etc. La acción mucolítica de ABRILAR permite disminuir la viscosidad y fluidificar las secreciones; la acción broncoespasmolítica de ABRILAR se verifica gracias a su efecto musculotropo selectivo sobre el músculo liso bronquial equivalente a 10 mg de papaverina y comparable a las tres horas de administrado, a 2 puff de fenoterol inhalado; estas dos propiedades facilitan la expectoración y permiten una sedación fisiológica progresiva de la tos sin necesidad de bloquear centralmente este reflejo defensivo.

INDICACIONES

Afecciones broncopulmonares con secreciones o tos seca irritativa.

CONTRAINDICACIONES

Carece de contraindicaciones

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

ABRILAR jarabe: Dado que el sorbitol se metaboliza a fructosa en el intestino, es conveniente valorar su indicación en pacientes con intolerancia a la misma. ABRILAR comprimido efervescente: En caso de intolerancia a la fructosa, el tratamiento sólo debe realizarse después de consultar al médico. Este medicamento no debe ser usado más de 15 días. Si no ceden los síntomas, consulte a su médico. Si tiene alguna duda en el uso de este producto, consulte al químico farmacéutico o al profesional de salud más cercano. Cada comprimido efervescente contiene 3 mg de sacarina sódica. La ingesta diaria admisible (IDA) de sacarina es de 5 mg/kg de peso. Cada comprimido efervescente contiene 50 mg de ciclamato de sodio. La ingesta diaria admisible (IDA) de ciclamato de sodio es de 11 mg/kg de peso.

REACCIONES ADVERSAS

Carece de efectos secundarios. En algunos raros casos puede tener un ligero efecto laxante debido al contenido de sorbitol en su formulación.

INTERACCIONES CON OTRAS DROGAS

No se conocen efectos adversos en el caso de administración simultánea de ABRILAR y otros medicamentos. Por lo tanto, este preparado puede combinarse en forma segura con otros medicamentos como, por ejemplo, antibióticos.

POSOLÓGIA Y FORMA DE ADMINISTRAR

ABRILAR jarabe: En niños pequeños 2,5 ml 3 veces por día, a los niños

en edad escolar y a los adolescentes 5 ml 3 veces por día, y a los adultos 5 - 7,5 ml de la solución 3 veces por día. Estas dosis pueden modificarse según criterio médico.

La duración del tratamiento depende del tipo y de la severidad del cuadro clínico; de todos modos, el tratamiento debe durar como mínimo una semana aún en el caso de inflamaciones menores del tracto respiratorio.

¡Agitar siempre bien el frasco antes de usar!
ABRILAR comprimido efervescente: A menos que el médico le indique otra dosis ABRILAR comprimidos efervescentes se deberá administrar de la siguiente forma: Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido efervescente 2 veces por día, uno por la mañana (o al medio día) y otro por la tarde. Disuelva el comprimido efervescente en un vaso de agua fría o tibia (200 ml aproximadamente), revolver y beber inmediatamente.

OBSERVACIONES

El agente extractivo etanol al 30% (p/p) sirve para obtener el extracto efectivo para el tratamiento a partir de las hojas de hiedra. El proceso de desecación que se aplica con posterioridad elimina completamente del extracto el contenido de alcohol. ABRILAR no contiene azúcar ni colorantes.

PRESENTACION

ABRILAR se presenta en un envase de 100 ml con un vasito dosificador. ABRILAR comprimidos efervescentes se presenta en estuche que contiene 10 comprimidos efervescentes en sachet individual.

BIBLIOGRAFIA

(1) J. Meyer-Wegener, K. Liebscher y M. Hettich ZFA 69. Volumen n°3, pp.61-66, 1993
(2) Mansfeld HJ, Hohre H, Reptes R, Dethlefsen U. Therapy of bronchial asthma with dried ivy leaf extract. MMW140 (1998): 3, 26-30.
(3) Estudio Multicéntrico Latinoamericano en archivo Departamento Médico. Phymed. 2006.

Pensando en el valor de la salud...

Su receta es fundamental

Sólo el médico conoce el mejor tratamiento

Mayor información a disposición del Cuerpo Médico a través de nuestros representantes (Departamento de Apoyo Médico)

ENGELHARD
ARZNEIMITTEL

PHARMA INVESTI



Abrilar alivia la tos

TRIPLE ACCIÓN TERAPÉUTICA

MUCOLÍTICO
BRONCOESPASMOLÍTICO
ANTITUSIVO



www.abrilar.cl






EFECTO BRONCODILATADOR DEMOSTRADO

Único expectorante con **ACCIÓN BRONCODILATADORA** a diferencia de Ambroxol.

Mayor incremento de la capacidad vital con ABRILAR



ABRILAR A DIFERENCIA DE AMBROXOL

mejora objetivamente los parámetros espirométricos que miden la función respiratoria como por ejemplo la capacidad vital.


Cuadro comparativo ABRILAR - Ambroxol

	Abrilar	Ambroxol
Efecto: • secretolítico • mucolítico • espasmolítico (anti-obstrutivo)	✓ ✓ ✓	✓ ✓ -
Efectos secundarios:	- - - -	• reacciones alérgicas • incremento de la salivación • incremento de la secreción nasal • constipación • dificultad para orinar
Eliminación:	No son necesarias precauciones	Renal 90% aprox. * debe ponerse atención en pacientes con insuficiencia renal
Riesgos:	Ninguno	En casos individuales: • congestión de la secreción Por sobredosis: • intoxicación (supervisión de la circulación)

ABRILAR disminuye la tos de manera natural y gradual sin bloquearla.
ABRILAR no presenta riesgos de depresión respiratoria ni cardiovascular.

Único con eficacia demostrada en 9.657 pacientes tratados

95,1%



95%

Eficacia global en patologías respiratorias

Abrilar

alivia la tos

TRIPLE ACCIÓN TERAPÉUTICA

MUCOLÍTICO

BRONCOESPASMOLÍTICO

ANTITUSIVO



www.abrilar.cl

Abrilar a diferencia de Ambroxol

Abrilar mejor que Ambroxol con respecto a la reducción en la tos y la expectoración.

Abrilar presenta mayor reducción en la dificultad respiratoria que Ambroxol.

Abrilar tiene un efecto estimulante sobre la expectoración y único con efecto broncodilatador demostrado.

